



野漆。

前不久,知名短视频创作者李子柒在停更三年多后发布了一条采用“雕漆隐花”工艺为奶奶打造漆门的视频。不过,李子柒在接受媒体采访时表示,她在初次接触生漆后,产生了严重的过敏反应,身上长了很多红斑,团队曾组队去医院打抗敏针。

生漆是漆树韧皮部分泌的一种乳白色液体,用途广泛,被称为“涂料之王”。然而,正如武侠小说中亦正亦邪的双面人物,对中国历史文化颇有贡献的漆树,也是致人过敏的“大户”。

漆树属植物,属无患子目、漆树科,在全球共有约20种,在我国有15种,具体包括漆(即漆树)、野漆、尖叶漆、黄毛漆、大花漆、大叶漆、毛漆树、云南漆等。其中,漆树主要分布于我国陕西、湖北、贵州、四川等地,而野漆则是分布于海南等地的一个品种。

漆树和野漆虽为乔木,但“个头”不算太高,花和果实更是长得娇小,藏在深山老林里并不显眼。如果说它们有什么特别之处,大概就是割开树皮,会流出乳白色液体,这一特征和海南人熟悉的橡胶树有几分相似之处。漆树在我国长江中上游省份较为常见,其小叶呈卵形或卵状椭圆形或长圆形,上有柔毛,成年后树皮粗糙,呈不规则纵裂。海南的野漆,外形和漆树相似,但也有个性特点——全株无毛,叶片的两端渐尖。

虽然“长相”平平,但漆树和野漆用途很多,说它们“浑身都是宝”也不为过。产自漆树的生漆是一种优良的自然涂料,其结成的漆膜附着力强,色泽光亮,耐磨、耐热、防腐、防潮;漆树的叶、花、根、皮、果均可入药;果皮可用于取蜡,是制作蜡烛、蜡纸的重要原料;漆籽可以用于榨油,在云南怒江傈僳族自治州等地,漆油是山区居民家中常备的食用油,特色菜肴漆油鸡远近闻名。

我国是漆树的原产地,对生漆的使用可追溯至7000年前的河姆渡时期。目前,我国仍是产漆大国,生漆是传统出口商品中的重要门类。

野漆分泌的乳白色液体,可作为生漆的替代品使用。杨小波等人编著的《海南植物志》记载,野漆的果皮可取蜡,可用于制作膏药、香膏、发油等,亦可用于涂布以增光泽;用野漆种子榨的油,可用于制作肥皂或掺和其他干性油制作油漆;野漆木材坚硬致密,海南农村地区有群众用它制作扁担。

漆树和野漆之所以本领强大,主要缘于其体内含有漆酚等化合物。这些化合物其实是植物进化过程中形成的一种自我保护的手段,可有效防止动物啃食和病菌侵害。而无论是在生漆固化成膜的过程中,还是在制蜡、制膏的过程中,漆酚都扮演着关键角色。

海南野漆也“咬人”

不过,就如一枚硬币有正反两面,漆酚成就了漆树、野漆,也给靠近这“两棵树”的人带去了不少烦恼,因为它是过敏原。

在湖北、贵州、四川等省份山区,漆酚是导致接触性皮炎的主要过敏原之一。漆树没有牙齿,也不长尖刺,却不能乱碰。一些农村孩子爬上漆树掏鸟蛋,或只折了一根树枝,或不小心碰了一下漆叶,回家后出现了皮肤红肿、瘙痒等症状。

相关研究表明,接触漆树导致的过敏,通常表现为局部起红斑、丘疹、水疱等,皮肤瘙痒,过敏反应严重的,可表现为较大面积或全身出现红斑、丘疹、水疱、渗液等,如处理不及时,还可能引发组织坏死、呼吸困难等症状。

正因如此,在一些漆树分布较多的地方,因常有人“中招”,人们将漆树称为“咬人树”,在山上见到它,要绕道走。

分布于海南儋州、澄迈等地的野漆,也含有漆酚,易致人过敏。“有一次我和团队的同事在户外考察,一位同事爬山爬累了,看到树就扶,结果过敏了,去了趟医院。”海南大学二级教授、博士生导师杨小波博士介绍,海南的野漆分布较广,在中、低海拔的森林中较为常见,触碰到了容易过敏,所以在野外做调查时要特别小心。

为什么漆酚会导致人过敏呢?中央民族大学生命与环境科学学院刘立亚等专家认为,漆酚的分子结构具有亲脂性,这意味着它能轻易穿透皮肤表层,漆酚中的十五烷基儿茶酚会引起严重的皮肤过敏反应。值得注意的是,过敏反应可能滞后,有的人在接触漆酚6小时内出现过敏,更典型的发作时间窗是24小时到72小时,在某些极端情况下,潜伏期甚至可能延长一周至两周。

漆酚不仅存在于漆树和野漆中,还存在于其他漆树科植物及其果实中,比如热带水果芒果(学名杧果)。杧果为漆树科杧果属植物,它的果皮里含有极少量的漆酚,果肉中则有果酸等刺激性物质,这就是个别人吃芒果过敏的原因。

漆酚过敏如何应对

在中医典籍的相关记述中,生漆(漆酚)导致的过敏,被称为“漆疮”,而西医则将其归为变应性接触性皮炎。接触性皮炎,是临床常见的一种过敏性皮肤病,发病不局限于接触部位。常用的治疗方法包括口服抗过敏药物、外用激素类药膏、打抗敏针等。

我国古人已与漆树属植物打交道数千年,在处理“漆疮”方面积累了不少经验。在贵州、湖北、云南等地,流传着许多应对漆酚过敏的土方法,比如有人在“中招”后,用杉树皮或青灰叶下珠的枝叶煮水擦拭身体,有人将蜂蜜或非菜汁涂抹于红肿处。以前,在海南民间,如果有人因接触野漆过敏,人们会立即杀鸡,然后用鸡毛煮水,给他擦洗身体。这些土方法,是否有科学依据,目前尚未有明确结论。

如果你在户外因接触漆树、野漆等出现了过敏症状,应立即到正规医院的皮肤科就诊。因交通等原因不方便就医时,可尽快脱去被污染的衣服,使用大量清水清洗身体接触部位及全身。湖南省中医院皮肤科主任、主任医师汪海珍在接受媒体采访时介绍,有研究发现,漆酚接触皮肤约10分钟后,50%可去除;30分钟后可去除10%;而1小时后不能去除。

如果你喜欢去野外徒步、爬山,为避免被漆酚“击中”,进山时最好穿长袖衣、扎住袖口,穿长裤、戴帽子、戴手套、穿袜子,穿长筒胶鞋或球鞋。进山前,最好对漆树属植物的形态有一个基本的认知。另外,自然界还有不少像野漆一样的植物,如荨麻、红豆树等,它们也可能导致接触性皮炎。所以,遇到后尽量不要徒手采摘、砍削其枝叶或果实。若你是过敏性体质,平时买水果应挑选成熟的芒果,戴上一次性手套,削去芒果皮,将果肉切成小块,用牙签或叉子食用。

咬人的漆树

身怀绝技的漆树属植物

海南日报全媒体记者 罗安明




漆树流出生漆。本版图片均为资料图

国家级非遗漆艺

- ▼ 镇漆树坝村 (广东省河源市黄村)
- ▼ 淳区漆桥街道 (江苏省南京市高)
- ▼ 勉县漆树坝镇 (陕西省汉中市)
- ▼ 自流井区 (四川省自贡市)
- ▼ 漆树乡(现已并入自流井区)
- ▼ 四川省自贡市土家族乡
- ▼ 市宣汉县漆树 (四川省达州)
- ▼ 技艺(贵州省)
- ▼ 彝族漆器髹饰 (贵州省)
- ▼ 髹饰技艺(山西省)
- ▼ 平遥推光漆器 (山西省)
- ▼ 饰技艺(江西省)
- ▼ 鄱阳脱胎漆器髹 (江西省)
- ▼ (安徽省)
- ▼ 徽州漆器髹饰技艺 (安徽省)
- ▼ 重庆漆器髹饰技艺 (重庆市)
- ▼ 成都漆艺(四川省)

漆地名



故宫博物院藏元代剔红栀子花纹圆盘。

制图孙发强
文字整理罗安明